

EFAVIRENZ (SUSTIVA®)

Conté el principi actiu Efavirenz.

Efavirenz és un inhibidor no nucleòsid de la transcriptasa inversa, és a dir, bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

A l'administrar Sustiva® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Sustiva® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre sencers amb un got d'aigua, amb o sense aliments .
Si es pren amb aliments, es preferible que els àpats siguin lleugers i pobres en greixos.

Que fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada.
No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces tant en els pacients homes com dones durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament

Sustiva® pot produir mareig, trastorns de la concentració i/o somnolència. Si presenta aquest símptomes ha d'evitar conduir o utilitzar màquines.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Sustiva® trobem:

Trastorns del sistema nerviós (sons anormals, ansietat, depressió, insomni, alteració de la concentració, mareig, mal de cap), trastorns gastrointestinals (vòmits, diarrea, nàusees, dolor abdominal), erupció a la pell i pruija.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Els efectes secundaris poden aparèixer al inici del tractament i solen desaparèixer en 2-4 setmanes sense haver-lo de interrompre.

Els símptomes nerviosos disminueixen al prendre el medicament a l'hora d'anar a dormir.

Si al matí següent es troba marejat, confús o somnolent pot avançar l'administració del fàrmac unes hores.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Sustiva® 600 mg comprimits

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.
Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS		Descripción			
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	AMARILLO OSCURO	NO		SUSTIVA N/A	NO