

## IXEKIZUMAB (TALTZ®)

Taltz® conté el principi actiu Ixekizumab.

Ixekizumab és un agent biològic indicat per al tractament de la psoriasis.

### **Com s'ha de prendre?**


Taltz® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar en les zones de la pell on es manifesti psoriasis.

Taltz® s'administra una dosi de 160mg ( 2 xeringues) a la setmana 0, 80 mg a les setmanes 2, 4,6,8 10 i 12. Posteriorment 80 mg cada 4 setmanes .

Taltz® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.  
No agitar.

### **Que fer si s'oblida una dosi?**

Consulti al seu metge o farmacèutic.  
No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.



### **Precaucions**

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 10 setmanes després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament .

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Taltz®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Utilitzar amb precaució amb pacients amb MII: malaltia de Crohn i colitis ulcerosa.

### **Presentacions comercials**

Presentacions en el nostre centre:

Taltz® 80 mg ploma



### ***Interaccions amb altres medicaments***

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Taltz<sup>®</sup> com la warfarina. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic

### ***Efectes secundaris***

Entre els efectes adversos més freqüents associat a Taltz<sup>®</sup> trobem:  
risc augmentat de patir infeccions de les vies respiratòries altes, envermelliment i pruíja en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

### ***Conservació***

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No congelar.

Conservar en l'envàs original, protegit de la llum.

Taltz<sup>®</sup> es pot conservar sense frigorífic fins a 5 dies a una temperatura no superior a 30°C.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

### ***Hàbits saludables***

Es important establir una rutina:

- Dutxa diària preferentment al matí amb un sabó suau en poca quantitat. Esbandir bé. A continuació aplicar el tractament tòpic prescrit pel seu metge i la loció corporal hidratant.
- A la nit hidratar i tractar les zones afectades.
- A l'hivern: hidratar les mans i protegir-se del fred. La roba més pegada al cos ha de ser de fibres naturals com el cotó.
- A l'estiu prendre el sol evitant les hores del migdia (de 12h a 16h). Aplicar protecció solar resistent a l'aigua 20 minuts abans de l'exposició. Repetir l'aplicació periòdicament.
- L'aigua del mar és beneficiosa pels pacients amb psoriasi, malgrat la sal pugui produir picor.
- L'aigua de la piscina conté productes que poden irritar i secar la pell. Dutxar-se després del bany.
- Fer exercici regularment
- Prendre una dieta equilibrada limitant els greixos.

### ***Si vol saber més pot consultar...***

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>